

# ОСОБЕННОСТИ ДЕФИКАЦИИ ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ

Особенности опорожнения кишечника первых недель жизни:

- ✓ в грудном молоке присутствует специальное вещество, стимулирующее опорожнение кишечника
- ✓ опорожнение кишечника происходит практически после каждого кормления
- ✓ с ростом и развитием крохи, количества вещества отвечающего за опорожнение кишечника, падает

На рубеже 1,5 - 2 - 2,5 месяцев малыш начинает учиться самостоятельно и почти осознанно справиться с проблемой опорожнения кишечника.

В этот период может возникнуть такой феномен, как **запор на фоне полного благополучия** крохи.

Данное явление связано с “тестированием” емкости прямой кишки организмом ребенка.

Если у вашего малыша находящегося на ГВ на протяжении 1-2-3-4 и даже 5 суток отсутствует стул, но при этом он:

- ✓ активный, веселый, малыша ничего не беспокоит
- ✓ нет повышения температуры
- ✓ нет бледности кожи и слизистых оболочек
- ✓ нет рвоты, повышенного срыгивания, срыгиваний фонтаном
- ✓ нет других проявлений болезни

**Нет необходимости принимать активным мер направленных на стимулирование акта дефекации.**

## ОСОБЕННОСТИ ДЕФИКАЦИИ ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ

Данное явление обычно заканчивается самостоятельной дефекацией большим объемом за несколько раз. В дальнейшем появляется новый алгоритм дефекации. Чаще всего 1 раз в 1-2 дня.

В случае прерывания эксперимента, организм попытается провести его еще раз.

Не стоит оставлять вашего малыша **без помощи и/или консультации врача**, если у малыша на фоне запора вы видите:

- ✓ сильное и/или циклически возникающее беспокойство
- ✓ малыш вялый, сонливый, заторможенный
- ✓ есть изменение/увеличение количества, объема и внешнего вида срыгивания
- ✓ есть рвота и срыгивания фонтаном
- ✓ отмечается бледность кожи и слизистых оболочек
- ✓ повышена температура